AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grandes Cultures

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 6 du 05 Mai 2000
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

CEREALES

Les blés sont pour la grande majorité au stade gonflement, les barbes commencent à apparaître dans la gaine de la dernière feuille qui se déchire pour les plus avancés.
L'**Oïdium** est la maladie la plus présente et atteint la F2 avec quelques coussinets sur les variétés sensibles; les F3 sont fréquemment touchées.
La **Rouille brune** se manifeste très timidement par quelques pustules sur les F3.
La **Septoriose** n'évolue absolument pas.
Nous avons découvert 1 ou 2 tâches de **Microdochium nivale** sur feuilles.
La **Rouille jaune** est bien présente sur du Vito non traité mais n'a pas été trouvée sur les blés durs. De toute façon elle n'apparaîtra plus sur les parcelles protégées.
Actuellement toutes les cultures devraient avoir été traitées selon nos précédents avis; les maladies ne peuvent qu'évoluer, les conditions leur sont excessivement favorables.
Si certaines parcelles plus tardives n'ont pas encore été protégées, réalisez un traitement rapidement pour assurer une couverture jusqu'au début floraison.

En cas de nécessité reportez-vous à notre bulletin du 25 Avril.
avec strobilurine: Ogam à 1 L/Ha ou Amistar pro à 2 L/Ha
sans strobilurine Capitole à 1.5 L/Ha

Les orges sont à l'épiaison et présentent quelques pustules de Rouille naine; réalisez une protection.
Les blés tendres sont pour l'instant relativement indemnes de maladies; attention toutefois à l'évolution des rouilles.
Pour ces cultures voir les conseils blés durs.

Les **Pucerons** sont encore peu présents sur feuilles.
Les parcelles ou les zones ayant présenté des **Zabres** à l'automne sont à surveiller quant à l'apparition des adultes sur les épis qui consomment les jeunes grains en formation.

COLZA

L'**Oïdium** a peu évolué ces derniers temps; il était parfois présent au bas des tiges mais a tendance pour l'instant à sécher.
Une intervention peut être envisagée dès les premières manifestations sur siliques et ce jusqu'à 3 semaines avant récolte.
Pour l'instant une protection est inutile.

POIS

Ces cultures sont en début floraison.
Dans les boutons floraux des **Pucerons** sont présents.
Une protection est nécessaire:
Best ou Karaté K à 1.25 L/Ha

Les maladies sont absentes.
Une application de couverture pourra être envisagée à la chute des pétales; avec des humidités matinales ou pluies ces derniers restent collés sur les jeunes gousses en formation et peuvent entraîner l'apparition de Botrytis; utilisez alors
Walabi ou Maori à 2 L/ha
Cicero 2 L/Ha

Protection abeilles:
Même si les pois ne sont pas autant fréquentés que les colzas par les abeilles, il est recommandé de ne pas opérer de mélange de triazoles ou imidazoles avec des pyréthrinoïdes.
Respectez un délai de quelques jours entre les applications d'autant que les problèmes ne sont pas forcément simultanés.

CEREALES:
peu d'évolution
la protection doit être assurée.

COLZA
Oïdium pas d'intervention

POIS
traitement
Pucerons

DRAF
Service Régional de la protection des Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Languedoc Roussillon
Directeur gérant: M.FREYDIER
Publication périodique
C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582